

Síntomas

Esta enfermedad no causa daños en el perro, pero si lo hace en los huéspedes intermediarios y en el humano a quienes puede afectar en forma leve o grave (depende del tamaño y la ubicación de los quistes). En algunos casos puede provocar la muerte.

Autores:
Tec. Agr. **Martin Femenias**
Prohuerta Trelew-Chubut
mfemenias@chubut.inta.gov.ar

Med. Vet. **Pablo Agustinho**
Jefe Subprograma zoonosis
Municipalidad de Trelew
inspecciongeneral@trelew.gov.ar



Dibujos:
Lautaro Defosse

INTA EEA Chubut

ex - Ruta 25 - Km. 1480 - Trelew (Chubut)
T.E: (0280) 444 6658 - Fax: (0280) 444 7019

HIDATIDOSIS

Prevención

- Desparasitar a los perros en forma periódica.
- No darle viseras crudas a los perros. (Dárselas cocidas)
- Lavarse correctamente las manos.
- Lavar correctamente los alimentos antes de ingerirlos crudos.
- Evitar el ingreso de perros a las huertas y reservorios de agua.

Más información:

Coordinador provincial del Proyecto:
Ing. Agr. Mirco M. Muñoz

Asistente: Sra. Ana María Camejo
Técnicos ProHUERTA en CHUBUT

* **AER VIRCh - (0280) 444 6654**
Lic. Silvina Hualpa; Prof. Gstr. Juan P. López;
Téc. Martín Femenias y Ing. Ftal. Andrea Garrido

* **AER Comodoro - (0297) 446 1067**
Téc. José Cepeda; Ing. Agr. Jimena Villafañe;
Sr. Nelson N. Aranguiz A.

* **Oficina Puerto Madryn**
Agr. Nac. María Teresa Ríos Blanco

* **AER Sarmiento - (0297) 489 3007**
Téc. Agr. Cristina Esquivel

* **EEAF Esquel - (02945) 45 3515**
Srta. Cristina Gallardo; Ing. Walter Matthiess

* **OIT 28 de Julio - Dolavon**
Sra. Fernanda Mombelli (0280) 15457 4139

* **AER Paso de Indios**
Sra. Leticia Calfinao (0280) 449 7227

HIDATIDOSIS

Ciclo parasitario y Prevención



PRO
HUERTA
20 AÑOS

PLAN NACIONAL DE
Seguridad Alimentaria




Ministerio de
Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

HIDATIDOSIS

La hidatidosis es una enfermedad producida por el parásito *Equinococcus granulosus* que se aloja en el intestino de los perros y puede ser transmitida a las personas.

Si le damos de comer vísceras crudas a nuestro perro, reiniciamos y mantenemos el ciclo del parásito.



El pasto contaminado puede ser ingerido por animales herbívoros. Los huevos de la tenia son activados en el intestino y forma quistes en distintos órganos.




El huésped aloja al parásito y puede ser:

- **Definitivo** (Perro): Aloja al parásito adulto. Generalmente no presenta síntomas de la enfermedad.

- **Intermediario** (Vacas, Ovejas, Cabras, etc.): Aloja al parásito en estado de larva. Enferman al ingerir los huevos del parásito eliminados por el huésped definitivo.

Ciclo parasitario



El perro contiene tenias adultas en su intestino y elimina constantemente huevos al medio ambiente con sus heces. Contaminando pasto, agua y alimentos.

- **Accidental** (Humanos): Aloja al parásito en estado de larva cortando el ciclo. Se enferman al ingerir agua y alimentos contaminados con los huevos eliminados en las heces del huésped definitivo.

Si jugamos con un perro parasitado podemos contaminarnos con huevos de la tenia.



Si el perro ingresa a la huerta puede contaminar las hortalizas con huevos de la tenia.



Si los alimentos contaminados son consumidos por las personas, el huevo se activa en el intestino y luego de un tiempo puede llegar al hígado o pulmones donde se forman quistes.

